

抗インフルエンザ薬

タミフル(カプセル75mg, ドライシロップ3%)

クレアチニンクリアランス	治療	予防(保険適応外)
30<Ccr	1回75mg(1Cap) 1日2回 5日間	1回75mg(1Cap) 1日1回 10日間
10<Ccr≤30	1回75mg(1Cap) 1日1回 5日間	1回75mg(1Cap) 1日1回 隔日 10日間
Ccr≤10 CAPD HD	1回75mg(1Cap) 1回のみ	1回75mg(1Cap) 1回のみ
小児	1回2mg/kg 1日2回 5日間 (1回75mgを超えない)	

10代は原則として処方控える

1歳未満に対する安全性は確立していない

リレンザ

	治療	予防(保険適応外)
成人・小児(5歳以上) (腎機能による減量なし)	1回10mg(2ブリスター) ※1ブリスターは5mg 1日2回 5日間	1回10mg(2ブリスター) ※1ブリスターは5mg 1日1回 10日間
	処方例 △リレンザ(4ブリスター/枚) 5枚 ..吸入 1日2回使用 ..1回2個使用する	処方例 △リレンザ(4ブリスター/枚) 5枚 ..吸入 1日1回使用 ..1回2個使用する

肺炎合併時は吸入薬を使わない

小児に関しては、適切に吸入できると判断された場合にのみ投与

イナビル 治療と予防が同じ H28追加承認 ※1容器は20mg

	治療	予防(保険適応外)
10歳以上 (腎機能による減量なし)	1回40mg(2容器) 1日1回 単回	1回20mg(1容器) 1日1回 2日間 又は 1回40mg(2容器) 1日1回 単回
	処方例 △イナビル吸入粉末剤20mg 20mg/個 2個 ...吸入 1日1回使用 ...1回2個使用する	2日間投与の場合の処方例 △イナビル吸入粉末剤20mg 20mg/個 2個 ...吸入 1日1回使用 ...1回1個使用する
10歳未満	1回20mg(1容器) 1日1回 単回	1回20mg(1容器) 1日1回 単回
	処方例 △イナビル吸入粉末剤20mg 20mg/個 1個 ...吸入 1日1回使用 ...1回1個使用する	処方例 △イナビル吸入粉末剤20mg 20mg/個 1個 ...吸入 1日1回使用 ...1回1個使用する

肺炎合併時は吸入薬を使わない

小児に関しては、適切に吸入できると判断された場合にのみ投与

ラピアクタ(バイアル150mg, バッグ300mg)

クレアチニンクリアランス	通常の場合	重症化するおそれのある患者の場合
50≤Ccr	300mg(15分以上かけて)	600mg(15分以上かけて)
30≤Ccr<50	100mg	200mg
10≤Ccr<30 HD	50mg	100mg
小児	10mg/kg(15分以上かけて) (1回600mgを超えない)	

3日以上反復投与した経験は限られる

低出生体重児、新生児、乳児に対する安全性は確立していない